

VACINOMETRO

Resultados dia 21 de Outubro

1.ª Vaga

Trabalho de campo de 15 de Outubro a 20 de Outubro de 2025

Época 2025-2026

FICHA TÉCNICA

Na amostra total estudada foram incluídos os seguintes grupos:

- *65 ou mais anos de idade;*
- *Doentes Crónicos;*
- *Profissionais de saúde em contacto com doentes;*
- *60-64 anos de idade;*
- *Grávidas*
- *Crianças entre os 6 e os 24 meses (foram inquiridos pais de crianças neste intervalo etário e responderam individualmente por cada filho no intervalo).*

As quotas apresentadas não são mutuamente exclusivas, o que significa que o mesmo indivíduo pode estar representado em mais do que uma quota (Exemplo: ter mais de 65 anos e ser Doente Crónico). Os únicos grupos exclusivos são os profissionais de saúde, as grávidas e as crianças

0. Detalhes da Amostra


As regiões definidas para análise englobam as seguintes NUTs III:

Norte	Alto Minho
	Cávado
	Ave
	Área Metropolitana do Porto
	Alto Tâmega
	Tâmega e Sousa
	Douro
	Terras de Trás-os-Montes
Centro	Oeste
	Região de Aveiro
	Região de Coimbra
	Região de Leiria
	Viseu Dão Lafões
	Beira Baixa
	Médio Tejo
	Beiras e Serra da Estrela
Área Metropolitana de Lisboa	Área Metropolitana de Lisboa
Alentejo	Alentejo Litoral
	Baixo Alentejo
	Lezíria do Tejo
	Alto Alentejo
	Alentejo Central
Algarve	Algarve

	n	%
Mais de 65 anos	1540	37,7
Doentes crónicos	899	22,0
Profissionais de Saúde em Contacto c/ Doentes	652	16,0
60 – 64 anos	731	17,9
Grávidas	601	14,7
Crianças entre os 6 e os 24 meses	435	10,7
	n	%
Norte	1210	29,6
Centro	884	21,7
Área Metropolitana de Lisboa	1428	35,0
Alentejo	161	3,9
Algarve	238	5,8
Região Autónoma dos Açores	81	2,0
Região Autónoma da Madeira	80	2,0
Feminino	2670	65,4
Masculino	1412	34,6
Total	4082	100,0

O processo de inquirição decorreu entre os dias 15 de Outubro e 20 de Outubro de 2025

PV Status reporting: 237 PV Data cases were identified during this market research study and were reported to Sanofi PV.



(*) que afecte o sistema respiratório
(**) ou outras doenças reumatológicas

VACINOMETRO



Amostra Total Estudada

6



Sub-análise Grávidas

35



Sub-análise Crianças entre 6 e 24 meses

42



Sub-análise População com Diabetes

50



Sub-análise População com Doença Cardiovascular

57



Sub-análise População com Doença Respiratória

64



Sub-análise ≥ 60 anos

71



Sub-análise 70 a 79 anos

78



Sub-análise ≥ 80 anos

85



Sub-análise ≥ 85 anos

92



Principais *Insights*

101

VACINOMETRO

Amostra total estudada





1. Percentagem de indivíduos vacinados

Vacinados 32,0%
(IC95%: 30,5%; 33,5%)

n=4082

Informação amostra:


À amostra em causa está associada:

- a. Uma margem de erro de $\pm 1,5\%$ para um IC de 95% no **total da amostra** (n=4082);
- b. Uma margem de erro de $\pm 2,5\%$ para um IC de 95% dentro do Target **65 ou mais anos** (n=1540);
- c. Uma margem de erro de $\pm 3,3\%$ para um IC de 95% dentro do Target **Doentes Crónicos** (n=899);
- d. Uma margem de erro de $\pm 3,8\%$ para um IC de 95% dentro do Target **Profissionais de Saúde em Contacto com Doentes** (n=652);
- e. Uma margem de erro de $\pm 3,6\%$ para um IC de 95% dentro do Target **60-64 anos** (n=731);
- f. Uma margem de erro de $\pm 4,0\%$ para um IC de 95% dentro do Target **Grávidas** (n=601);
- g. Uma margem de erro de $\pm 4,7\%$ para um IC de 95% dentro do Target **Crianças entre os 6 e os 24 meses** (n=435)

GRUPOS COM RECOMENDAÇÃO INCLUI:

- 65 ou mais anos de idade
- 60-64 anos de idade
- Doentes crónicos
- Profissionais de saúde em contacto com doentes
- Grávidas
- Crianças entre os 6 e os 24 meses

		
	Feminino	Masculino
TOTAL GRUPOS PRIORITÁRIOS	n=2670	n=1412
POPULAÇÃO ESTUDADA	36,3%	23,9%





1. Percentagem de indivíduos vacinados

Vacinados **32,0%**
(IC95%: 30,5%; 33,5%)

n=4082

Informação amostra:

À amostra em causa está associada:

- a. Uma margem de erro de $\pm 1,5\%$ para um IC de 95% no **total da amostra** (n=4082);
- b. Uma margem de erro de $\pm 2,5\%$ para um IC de 95% dentro do Target **65 ou mais anos** (n=1540);
- c. Uma margem de erro de $\pm 3,3\%$ para um IC de 95% dentro do Target **Doentes Crónicos** (n=899);
- d. Uma margem de erro de $\pm 3,8\%$ para um IC de 95% dentro do Target **Profissionais de Saúde em Contacto com Doentes** (n=652);
- e. Uma margem de erro de $\pm 3,6\%$ para um IC de 95% dentro do Target **60-64 anos** (n=731);
- f. Uma margem de erro de $\pm 4,0\%$ para um IC de 95% dentro do Target **Grávidas** (n=601);
- g. Uma margem de erro de $\pm 4,7\%$ para um IC de 95% dentro do Target **Crianças entre os 6 e os 24 meses** (n=435)

															
	65 ou mais anos de idade	Doentes Crónicos	Prof. de Saúde (*)	60– 64 anos de idade	Grávidas	Crianças entre os 6 e os 24 meses	Norte	Centro	Área Metro. Lisboa	Alentejo	Algarve	Região Aut. dos Açores	Região Aut. da Madeira	Feminino	Masculino
TOTAL DA AMOSTRA	n=1540	n=899	n=652	n=731	n=601	n=435	n=1210	n=884	n=1428	n=161	n=238	n=81	n=80	n=2670	n=1412
VACINADOS	39,0%	44,6%	32,8%	16,1%	38,6%	26,2%	34,5%	32,2%	30,3%	41,0%	29,8%	22,2%	18,8%	36,3%	23,9%
Intervalo de Confiança e Margem de Erro	IC95%: 36,5%; 41,5%	IC95%: 41,3%; 47,9%	IC95%: 29,0%; 36,6%	IC95%: 12,5%; 19,7%	IC95%: 34,6%; 42,6%	IC95%: 21,5%; 30,9%	IC95%: 31,7%; 37,3%	IC95%: 28,9%; 35,5%	IC95%: 27,7%; 32,9%	IC95%: 33,2%; 48,8%	IC95%: 23,4%; 36,2%	IC95%: 11,2%; 33,2%	IC95%: 7,8%; 29,8%	IC95%: 34,4%; 38,2%	IC95%: 21,3%; 26,5%

(*) Em contacto com doentes

Portugueses com > 65 anos vacinados (1)

945.408

Portugueses com 60-64 anos vacinados (1)

113.420

(1) Fonte: População residente em 16-12-2021 (Série longa, início 1970 - N.º) por Sexo e Idade; Anual - INE, Estimativas Anuais da População Residente
A presente extrapolação foi realizada apenas para indivíduos com idades compreendidas entre 60 e 64 anos e iguais ou superiores a 65 anos, residentes em território Continental e Ilhas. O universo estimado e que serviu de base à presente extrapolação foi, de acordo com a fonte supracitada, 704.473 indivíduos dos 60-64 anos e 2.424.122 indivíduos com 65 anos ou mais.



Execução e responsabilidade técnica:





1. Percentagem de indivíduos vacinados

Vacinados **32,0%**
(IC95%: 30,5%; 33,5%)

n=4082

Informação amostra:

À amostra em causa está associada:

- a. Uma margem de erro de $\pm 1,5\%$ para um IC de 95% no **total da amostra** (n=4082);
- b. Uma margem de erro de $\pm 2,5\%$ para um IC de 95% dentro do Target **65 ou mais anos** (n=1540);
- c. Uma margem de erro de $\pm 3,3\%$ para um IC de 95% dentro do Target **Doentes Crónicos** (n=899);
- d. Uma margem de erro de $\pm 3,8\%$ para um IC de 95% dentro do Target **Profissionais de Saúde em Contacto com Doentes** (n=652);
- e. Uma margem de erro de $\pm 3,6\%$ para um IC de 95% dentro do Target **60-64 anos** (n=731);
- f. Uma margem de erro de $\pm 4,0\%$ para um IC de 95% dentro do Target **Grávidas** (n=601);
- g. Uma margem de erro de $\pm 4,7\%$ para um IC de 95% dentro do Target **Crianças entre os 6 e os 24 meses** (n=435)



65 ou mais anos de idade

	Norte	Centro	Área Metro. Lisboa	Alentejo	Algarve	Região Aut. dos Açores	Região Aut. da Madeira
TOTAL DA AMOSTRA	n=444	n=410	n=496	n=46	n=88	n=35	n=21
VACINADOS	39,2%	44,9%	39,7%	47,8%	14,8%	17,1%	23,8%
Intervalo de Confiança e Margem de Erro	IC95%: 34,5%;	IC95%: 40,1%;	IC95%: 35,3%;	IC95%: 33,3%;	IC95%: 4,4%;	IC95%: 0,6%;	IC95%: 2,3%;
	43,9%	49,7%	44,1%	62,3%	25,2%	33,6%	45,3%



60 a 64 anos de idade

	Norte	Centro	Área Metro. Lisboa	Alentejo	Algarve	Região Aut. dos Açores	Região Aut. da Madeira
TOTAL DA AMOSTRA	n=187	n=145	n=299	n=17	n=50	n=16	n=17
VACINADOS	23,0%	13,8%	13,4%	0,0%	30,0%	0,0%	0,0%
Intervalo de Confiança e Margem de Erro	IC95%: 15,8%;	IC95%: 5,7%;	IC95%: 7,7%;	IC95%: 0,0%;	IC95%: 16,1%;	IC95%: 0,0%;	IC95%: 0,0%;
	30,2%	21,9%	19,1%	24,0%	43,9%	24,2%	24,0%



2. Motivos que levaram à Vacinação


Vacinados 32,0%
(IC95%: 30,5%; 33,5%)

n=4082

Informação amostra:

À amostra em causa está associada:

- a. Uma margem de erro de $\pm 1,5\%$ para um IC de 95% no total da amostra (n=4082);
- b. Uma margem de erro de $\pm 2,5\%$ para um IC de 95% dentro do Target 65 ou mais anos (n=1540);
- c. Uma margem de erro de $\pm 3,3\%$ para um IC de 95% dentro do Target Doentes Crónicos (n=899);
- d. Uma margem de erro de $\pm 3,8\%$ para um IC de 95% dentro do Target Profissionais de Saúde em Contacto com Doentes (n=652);
- e. Uma margem de erro de $\pm 3,6\%$ para um IC de 95% dentro do Target 60-64 anos (n=731);
- f. Uma margem de erro de $\pm 4,0\%$ para um IC de 95% dentro do Target Grávidas (n=601);
- g. Uma margem de erro de $\pm 4,7\%$ para um IC de 95% dentro do Target Crianças entre os 6 e os 24 meses (n=435)



(*) Sub-amostra sem inclusão de crianças entre os 6 e os 24 meses já vacinadas

2. Motivos que levaram à Vacinação

Vacinados 32,0%
(IC95%: 30,5%; 33,5%)

n=4082

Informação amostra:

À amostra em causa está associada:

- a. Uma margem de erro de $\pm 1,5\%$ para um IC de 95% no total da amostra (n=4082);
- b. Uma margem de erro de $\pm 2,5\%$ para um IC de 95% dentro do Target 65 ou mais anos (n=1540);
- c. Uma margem de erro de $\pm 3,3\%$ para um IC de 95% dentro do Target Doentes Crónicos (n=899);
- d. Uma margem de erro de $\pm 3,8\%$ para um IC de 95% dentro do Target Profissionais de Saúde em Contacto com Doentes (n=652);
- e. Uma margem de erro de $\pm 3,6\%$ para um IC de 95% dentro do Target 60-64 anos (n=731);
- f. Uma margem de erro de $\pm 4,0\%$ para um IC de 95% dentro do Target Grávidas (n=601);
- g. Uma margem de erro de $\pm 4,7\%$ para um IC de 95% dentro do Target Crianças entre os 6 e os 24 meses (n=435)

TOTAL DE VACINADOS

Vacinei-me por **recomendação do meu médico**

Vacinei-me por **iniciativa própria**, porque procuro sempre estar protegido(a)

Vacinei-me no contexto de uma **iniciativa laboral**

Vacinei-me porque sei que **faço parte dos grupos de risco** para esta patologia

Vacinei-me porque recebi notificação de **agendamento pelo SNS**

Outras razões

 65 ou mais anos de idade	 Doentes crónicos	 Profissionais de Saúde (*)	 60– 64 anos de idade	 Grávidas
n=601	n=399	n=214	n=118	n=232
56,9	70,9	0,9	41,5	73,7
24,6	8,3	32,2	38,1	7,8
0,3	3,3	65,0	4,2	12,1
2,5	6,0	1,9	--	5,6
15,0	11,3	--	16,1	0,9
0,7	0,3	--	--	--

(*) Em contacto com doentes



2. Motivos que levaram à Vacinação - Especialidade que recomendou a vacina

Vacinados 32,0%
(IC95%: 30,5%; 33,5%)


n=4082

Informação amostra:

À amostra em causa está associada:

- a. Uma margem de erro de $\pm 1,5\%$ para um IC de 95% no total da amostra (n=4082);
- b. Uma margem de erro de $\pm 2,5\%$ para um IC de 95% dentro do Target *65 ou mais anos* (n=1540);
- c. Uma margem de erro de $\pm 3,3\%$ para um IC de 95% dentro do Target *Doentes Crónicos* (n=899);
- d. Uma margem de erro de $\pm 3,8\%$ para um IC de 95% dentro do Target *Profissionais de Saúde em Contacto com Doentes* (n=652);
- e. Uma margem de erro de $\pm 3,6\%$ para um IC de 95% dentro do Target *60-64 anos* (n=731);
- f. Uma margem de erro de $\pm 4,0\%$ para um IC de 95% dentro do Target *Grávidas* (n=601);
- g. Uma margem de erro de $\pm 4,7\%$ para um IC de 95% dentro do Target *Crianças entre os 6 e os 24 meses* (n=435)

SUBAMOSTRA DE INQUIRIDOS QUE TENHAM 60 OU MAIS ANOS E QUE MENCIONARAM QUE SE VACINARAM POR RECOMENDAÇÃO DO MÉDICO





2. Histórico de Vacinação

Vacinados 32,0%


(IC95%: 30,5%; 33,5%)

n=4082

Informação amostra:

À amostra em causa está associada:

- a. Uma margem de erro de $\pm 1,5\%$ para um IC de 95% no **total da amostra** (n=4082);
- b. Uma margem de erro de $\pm 2,5\%$ para um IC de 95% dentro do Target **65 ou mais anos** (n=1540);
- c. Uma margem de erro de $\pm 3,3\%$ para um IC de 95% dentro do Target **Doentes Crónicos** (n=899);
- d. Uma margem de erro de $\pm 3,8\%$ para um IC de 95% dentro do Target **Profissionais de Saúde em Contacto com Doentes** (n=652);
- e. Uma margem de erro de $\pm 3,6\%$ para um IC de 95% dentro do Target **60-64 anos** (n=731);
- f. Uma margem de erro de $\pm 4,0\%$ para um IC de 95% dentro do Target **Grávidas** (n=601);
- g. Uma margem de erro de $\pm 4,7\%$ para um IC de 95% dentro do Target **Crianças entre os 6 e os 24 meses** (n=435)



- Já se vacinou contra a gripe em anos anteriores
- Não se vacinou contra a gripe em anos anteriores

(*) Sub-amostra sem inclusão de crianças entre os 6 e os 24 meses já vacinadas



2. Histórico de Vacinação

Vacinados 32,0%
(IC95%: 30,5%; 33,5%)

n=4082

Informação amostra:

À amostra em causa está associada:

- a. Uma margem de erro de $\pm 1,5\%$ para um IC de 95% no total da amostra (n=4082);
- b. Uma margem de erro de $\pm 2,5\%$ para um IC de 95% dentro do Target 65 ou mais anos (n=1540);
- c. Uma margem de erro de $\pm 3,3\%$ para um IC de 95% dentro do Target Doentes Crónicos (n=899);
- d. Uma margem de erro de $\pm 3,8\%$ para um IC de 95% dentro do Target Profissionais de Saúde em Contacto com Doentes (n=652);
- e. Uma margem de erro de $\pm 3,6\%$ para um IC de 95% dentro do Target 60-64 anos (n=731);
- f. Uma margem de erro de $\pm 4,0\%$ para um IC de 95% dentro do Target Grávidas (n=601);
- g. Uma margem de erro de $\pm 4,7\%$ para um IC de 95% dentro do Target Crianças entre os 6 e os 24 meses (n=435)

							
	65 ou mais anos de idade	Doentes Crónicos	Prof. de Saúde (*)	60– 64 anos de idade	Grávidas	Feminino	Masculino
TOTAL DE VACINADOS	n=601	n=397	n=214	n=118	n=232	n=871	n=320
NUNCA SE VACINOU CONTRA A GRIPE	1,5%	2,5%	0,9%	4,2%	44,8%	13,0%	2,5%
Intervalo de Confiança e Margem de Erro	IC95%: 0,0%;	IC95%: 0,0%;	IC95%: 0,0%;	IC95%: 0,0%;	IC95%: 38,4%;	IC95%: 9,7%;	IC95%: 0,0%;
	5,5%	7,4%	7,6%	13,2%	51,2%	16,3%	8,0%

(*) Em contacto com doentes



3. Aquisição da Vacina


Vacinados 32,0%
(IC95%: 30,5%; 33,5%)

n=4082

Informação amostra:

À amostra em causa está associada:

- a. Uma margem de erro de $\pm 1,5\%$ para um IC de 95% no **total da amostra** (n=4082);
- b. Uma margem de erro de $\pm 2,5\%$ para um IC de 95% dentro do Target **65 ou mais anos** (n=1540);
- c. Uma margem de erro de $\pm 3,3\%$ para um IC de 95% dentro do Target **Doentes Crónicos** (n=899);
- d. Uma margem de erro de $\pm 3,8\%$ para um IC de 95% dentro do Target **Profissionais de Saúde em Contacto com Doentes** (n=652);
- e. Uma margem de erro de $\pm 3,6\%$ para um IC de 95% dentro do Target **60-64 anos** (n=731);
- f. Uma margem de erro de $\pm 4,0\%$ para um IC de 95% dentro do Target **Grávidas** (n=601);
- g. Uma margem de erro de $\pm 4,7\%$ para um IC de 95% dentro do Target **Crianças entre os 6 e os 24 meses** (n=435)



(*) Sub-amostra sem inclusão de crianças entre os 6 e os 24 meses já vacinadas

- Comprada na Farmácia
- Recebida gratuitamente no Centro de Saúde
- Recebida gratuitamente no local de trabalho
- Recebida gratuitamente na Farmácia
- Outro local




Execução e responsabilidade técnica:




4. Aquisição da Vacina
Vacinados 32,0%
(IC95%: 30,5%; 33,5%)

n=4082



(*) Em contacto com doentes





3. Coadministração da vacina da gripe e da COVID-19

Vacinados 32,0%


(IC95%: 30,5%; 33,5%)

n=4082

Informação amostra:

À amostra em causa está associada:

- a. Uma margem de erro de $\pm 1,5\%$ para um IC de 95% no total da amostra (n=4082);
- b. Uma margem de erro de $\pm 2,5\%$ para um IC de 95% dentro do Target *65 ou mais anos* (n=1540);
- c. Uma margem de erro de $\pm 3,3\%$ para um IC de 95% dentro do Target *Doentes Crónicos* (n=899);
- d. Uma margem de erro de $\pm 3,8\%$ para um IC de 95% dentro do Target *Profissionais de Saúde em Contacto com Doentes* (n=652);
- e. Uma margem de erro de $\pm 3,6\%$ para um IC de 95% dentro do Target *60-64 anos* (n=731);
- f. Uma margem de erro de $\pm 4,0\%$ para um IC de 95% dentro do Target *Grávidas* (n=601);
- g. Uma margem de erro de $\pm 4,7\%$ para um IC de 95% dentro do Target *Crianças entre os 6 e os 24 meses* (n=435)



(*) Questão não aplicada ao target Crianças entre os 6 e os 24 meses



3. Motivos pelos quais optou pela coadministração


Vacinados 32,0%
(IC95%: 30,5%; 33,5%)

n=4082

Informação amostra:

À amostra em causa está associada:

- a. Uma margem de erro de $\pm 1,5\%$ para um IC de 95% no total da amostra (n=4082);
- b. Uma margem de erro de $\pm 2,5\%$ para um IC de 95% dentro do Target *65 ou mais anos* (n=1540);
- c. Uma margem de erro de $\pm 3,3\%$ para um IC de 95% dentro do Target *Doentes Crónicos* (n=899);
- d. Uma margem de erro de $\pm 3,8\%$ para um IC de 95% dentro do Target *Profissionais de Saúde em Contacto com Doentes* (n=652);
- e. Uma margem de erro de $\pm 3,6\%$ para um IC de 95% dentro do Target *60-64 anos* (n=731);
- f. Uma margem de erro de $\pm 4,0\%$ para um IC de 95% dentro do Target *Grávidas* (n=601);
- g. Uma margem de erro de $\pm 4,7\%$ para um IC de 95% dentro do Target *Crianças entre os 6 e os 24 meses* (n=435)



(*) Subamostra de inquiridos que referiu ter optado pela coadministração

3. Motivos pelos quais optou pela coadministração

Vacinados 32,0%
(IC95%: 30,5%; 33,5%)

n=4082

Informação amostra:

À amostra em causa está associada:

- a. Uma margem de erro de $\pm 1,5\%$ para um IC de 95% no total da amostra (n=4082);
- b. Uma margem de erro de $\pm 2,5\%$ para um IC de 95% dentro do Target 65 ou mais anos (n=1540);
- c. Uma margem de erro de $\pm 3,3\%$ para um IC de 95% dentro do Target Doentes Crónicos (n=899);
- d. Uma margem de erro de $\pm 3,8\%$ para um IC de 95% dentro do Target Profissionais de Saúde em Contacto com Doentes (n=652);
- e. Uma margem de erro de $\pm 3,6\%$ para um IC de 95% dentro do Target 60-64 anos (n=731);
- f. Uma margem de erro de $\pm 4,0\%$ para um IC de 95% dentro do Target Grávidas (n=601);
- g. Uma margem de erro de $\pm 4,7\%$ para um IC de 95% dentro do Target Crianças entre os 6 e os 24 meses (n=435)

TOTAL DE VACINADOS

- Quero estar protegido(a)
- O meu médico recomendou-me a coadministração
- Faço parte dos grupos de risco
- O meu farmacêutico recomendou-me a coadministração

	
65 ou mais anos de idade	60– 64 anos de idade
n=376(*)	n=69(*)
55,1	76,8
33,8	14,5
10,4	8,7
0,8	--

(*) Subamostra de inquiridos que referiu ter optado pela coadministração



3. Motivos pelos quais não optou pela coadministração


Vacinados 32,0%
(IC95%: 30,5%; 33,5%)

n=4082

Informação amostra:

À amostra em causa está associada:

- a. Uma margem de erro de $\pm 1,5\%$ para um IC de 95% no **total da amostra** (n=4082);
- b. Uma margem de erro de $\pm 2,5\%$ para um IC de 95% dentro do Target **65 ou mais anos** (n=1540);
- c. Uma margem de erro de $\pm 3,3\%$ para um IC de 95% dentro do Target **Doentes Crónicos** (n=899);
- d. Uma margem de erro de $\pm 3,8\%$ para um IC de 95% dentro do Target **Profissionais de Saúde em Contacto com Doentes** (n=652);
- e. Uma margem de erro de $\pm 3,6\%$ para um IC de 95% dentro do Target **60-64 anos** (n=731);
- f. Uma margem de erro de $\pm 4,0\%$ para um IC de 95% dentro do Target **Grávidas** (n=601);
- g. Uma margem de erro de $\pm 4,7\%$ para um IC de 95% dentro do Target **Crianças entre os 6 e os 24 meses** (n=435)



(*) Subamostra de inquiridos que referiu não ter optado pela coadministração

3. Motivos pelos quais não optou pela coadministração

Vacinados **32,0%**
(IC95%: 30,5%; 33,5%)

n=4082

Informação amostra:

À amostra em causa está associada:

- a. Uma margem de erro de **$\pm 1,5\%$** para um IC de 95% no **total da amostra (n=4082)**;
- b. Uma margem de erro de **$\pm 2,5\%$** para um IC de 95% dentro do Target **65 ou mais anos (n=1540)**;
- c. Uma margem de erro de **$\pm 3,3\%$** para um IC de 95% dentro do Target **Doentes Crónicos (n=899)**;
- d. Uma margem de erro de **$\pm 3,8\%$** para um IC de 95% dentro do Target **Profissionais de Saúde em Contacto com Doentes (n=652)**;
- e. Uma margem de erro de **$\pm 3,6\%$** para um IC de 95% dentro do Target **60-64 anos (n=731)**;
- f. Uma margem de erro de **$\pm 4,0\%$** para um IC de 95% dentro do Target **Grávidas (n=601)**;
- g. Uma margem de erro de **$\pm 4,7\%$** para um IC de 95% dentro do Target **Crianças entre os 6 e os 24 meses (n=435)**

TOTAL DE NÃO VACINADOS

- Por opção não quis levar a coadministração
- Vacinei-me contra a gripe e, portanto, não preciso da vacina contra a COVID-19
- O meu médico não me recomendou a coadministração
- Sou saudável
- Não faço parte dos grupos de risco
- Tive COVID-19 há menos de 3 meses
- Outro motivo
- NS|NR

	
65 ou mais anos de idade	60– 64 anos de idade
n=225 (*)	n=49(*)
0,0	0,0
23,1	26,5
39,6	10,2
6,2	28,6
7,6	0,0
0,4	0,0
20,0	28,6
3,1	6,1

(*) Subamostra de inquiridos que referiu não ter optado pela coadministração



5. Razões para não ter sido vacinado

Não vacinados 68,0%
(IC95%: 66,5%; 69,5%)

n=4082

Informação amostra:

À amostra em causa está associada:

- a. Uma margem de erro de $\pm 1,5\%$ para um IC de 95% no total da amostra (n=4082);
- b. Uma margem de erro de $\pm 2,5\%$ para um IC de 95% dentro do Target *65 ou mais anos* (n=1540);
- c. Uma margem de erro de $\pm 3,3\%$ para um IC de 95% dentro do Target *Doentes Crónicos* (n=899);
- d. Uma margem de erro de $\pm 3,8\%$ para um IC de 95% dentro do Target *Profissionais de Saúde em Contacto com Doentes* (n=652);
- e. Uma margem de erro de $\pm 3,6\%$ para um IC de 95% dentro do Target *60-64 anos* (n=731);
- f. Uma margem de erro de $\pm 4,0\%$ para um IC de 95% dentro do Target *Grávidas* (n=601);
- g. Uma margem de erro de $\pm 4,7\%$ para um IC de 95% dentro do Target *Crianças entre os 6 e os 24 meses* (n=435)





5. Razões para não ter sido vacinado

Não vacinados 68,0%
(IC95%: 66,5%; 69,5%)

n=4082

Informação amostra:

À amostra em causa está associada:

- a. Uma margem de erro de $\pm 1,5\%$ para um IC de 95% no total da amostra (n=4082);
- b. Uma margem de erro de $\pm 2,5\%$ para um IC de 95% dentro do Target 65 ou mais anos (n=1540);
- c. Uma margem de erro de $\pm 3,3\%$ para um IC de 95% dentro do Target Doentes Crónicos (n=899);
- d. Uma margem de erro de $\pm 3,8\%$ para um IC de 95% dentro do Target Profissionais de Saúde em Contacto com Doentes (n=652);
- e. Uma margem de erro de $\pm 3,6\%$ para um IC de 95% dentro do Target 60-64 anos (n=731);
- f. Uma margem de erro de $\pm 4,0\%$ para um IC de 95% dentro do Target Grávidas (n=601);
- g. Uma margem de erro de $\pm 4,7\%$ para um IC de 95% dentro do Target Crianças entre os 6 e 24 meses (n=435)

TOTAL DE NÃO VACINADOS

Sou saudável
Nunca fico com gripe
Por não ser hábito
Não faço parte dos grupos de risco
O meu médico não me recomendou a vacina
Por falta de oportunidade
Outro motivo
Por opção não quer tomar
Está agendado para os próximos dias/semanas
Está à espera de ser chamado
Por motivos de saúde não pode ser vacinado
Má experiência no passado
Ainda é cedo

(*) Em contacto com doentes

65 ou mais anos de idade	Doentes crónicos	Prof. de Saúde (*)	60- 64 anos de idade	Grávidas
n=939	n=495	n=438	n=613	n=369
5,5	0,2	7,1	15,5	15,4
2,4	4,8	5,7	5,5	5,1
20,0	24,8	50,0	50,6	32,5
0,6	1,6	0,2	5,2	17,3
1,0	1,6	1,1	0,7	15,2
51,5	54,3	15,8	14,8	8,9
0,4	0,4	0,0	0,8	0,0
9,1	4,8	5,9	4,2	4,6
4,2	3,0	0,2	1,1	0,0
1,5	0,2	3,7	0,7	0,5
2,0	2,6	0,7	0,0	0,0
0,4	0,0	0,2	0,0	0,0
1,3	1,4	9,4	0,8	0,3



4. Intenção de vacinação

Não vacinados 68,0%

(IC95%: 66,5%; 69,5%)

n=4082


Informação amostra:

À amostra em causa está associada:

- a. Uma margem de erro de $\pm 1,5\%$ para um IC de 95% no **total da amostra** (n=4082);
- b. Uma margem de erro de $\pm 2,5\%$ para um IC de 95% dentro do Target **65 ou mais anos** (n=1540);
- c. Uma margem de erro de $\pm 3,3\%$ para um IC de 95% dentro do Target **Doentes Crónicos** (n=899);
- d. Uma margem de erro de $\pm 3,8\%$ para um IC de 95% dentro do Target **Profissionais de Saúde em Contacto com Doentes** (n=652);
- e. Uma margem de erro de $\pm 3,6\%$ para um IC de 95% dentro do Target **60-64 anos** (n=731);
- f. Uma margem de erro de $\pm 4,0\%$ para um IC de 95% dentro do Target **Grávidas** (n=601);
- g. Uma margem de erro de $\pm 4,7\%$ para um IC de 95% dentro do Target **Crianças entre os 6 e os 24 meses** (n=435)

GRUPOS COM RECOMENDAÇÃO INCLUI:

- 65 ou mais anos de idade
- 60-64 anos de idade
- Doentes crónicos
- Profissionais de saúde em contacto com doentes
- Grávidas
- Crianças entre os 6 e os 24 meses



4. Intenção de vacinação

Não vacinados 68,0%
(IC95%: 66,5%; 69,5%)

n=4082

Informação amostra:

À amostra em causa está associada:

- a. Uma margem de erro de $\pm 1,5\%$ para um IC de 95% no **total da amostra** (n=4082);
- b. Uma margem de erro de $\pm 2,5\%$ para um IC de 95% dentro do Target **65 ou mais anos** (n=1540);
- c. Uma margem de erro de $\pm 3,3\%$ para um IC de 95% dentro do Target **Doentes Crónicos** (n=899);
- d. Uma margem de erro de $\pm 3,8\%$ para um IC de 95% dentro do Target **Profissionais de Saúde em Contacto com Doentes** (n=652);
- e. Uma margem de erro de $\pm 3,6\%$ para um IC de 95% dentro do Target **60-64 anos** (n=731);
- f. Uma margem de erro de $\pm 4,0\%$ para um IC de 95% dentro do Target **Grávidas** (n=601);
- g. Uma margem de erro de $\pm 4,7\%$ para um IC de 95% dentro do Target **Crianças entre os 6 e os 24 meses** (n=435)

															
	65 ou mais anos de idade	Doentes crónicos	Prof. de Saúde (*)	60– 64 anos de idade	Grávidas	Crianças entre os 6 e os 24 meses	Norte	Centro	Área Metro. Lisboa	Alentejo	Algarve	Região Aut. dos Açores	Região Aut. da Madeira	Feminino	Masculino
TOTAL DE NÃO VACINADOS	n=939	n=498	n=438	n=613	n=369	n=321	n=793	n=599	n=995	n=95	n=167	n=63	n=65	n=1702	n=1075
TENCIONA VACINAR-SE	60,7%	61,8%	26,5%	18,4%	12,5%	19,3%	28,5%	38,6%	32,5%	14,7%	40,7%	44,4%	29,2%	29,3%	38,1%
Intervalo de Confiança e Margem de Erro	IC95%:	IC95%:	IC95%:	IC95%:	IC95%:	IC95%:	IC95%:	IC95%:	IC95%:	IC95%:	IC95%:	IC95%:	IC95%:	IC95%:	IC95%:
	57,5%; 63,9%	57,4%; 66,2%	21,8%; 31,2%	14,5%; 22,3%	7,4%; 17,6%	13,8%; 24,8%	25,0%; 32,0%	34,6%; 42,6%	29,4%; 35,6%	4,7%; 24,7%	33,1%; 48,3%	32,1%; 56,7%	17,0%; 41,4%	26,9%; 31,7%	35,1%; 41,1%

(*) Em contacto com doentes



5. Intenção de coadministração

Não vacinados 68,0%
(IC95%: 66,5%; 69,5%)


n=4082

Informação amostra:

À amostra em causa está associada:

- a. Uma margem de erro de $\pm 1,5\%$ para um IC de 95% no **total da amostra** (n=4082);
- b. Uma margem de erro de $\pm 2,5\%$ para um IC de 95% dentro do Target **65 ou mais anos** (n=1540);
- c. Uma margem de erro de $\pm 3,3\%$ para um IC de 95% dentro do Target **Doentes Crónicos** (n=899);
- d. Uma margem de erro de $\pm 3,8\%$ para um IC de 95% dentro do Target **Profissionais de Saúde em Contacto com Doentes** (n=652);
- e. Uma margem de erro de $\pm 3,6\%$ para um IC de 95% dentro do Target **60-64 anos** (n=731);
- f. Uma margem de erro de $\pm 4,0\%$ para um IC de 95% dentro do Target **Grávidas** (n=601);
- g. Uma margem de erro de $\pm 4,7\%$ para um IC de 95% dentro do Target **Crianças entre os 6 e os 24 meses** (n=435)

SUBAMOSTRA DE INQUIRIDOS QUE TEM INTENÇÃO DE SE VACINAR, COM MAIS DE 60 ANOS DE IDADE



(*) Questão não aplicada ao target Crianças entre os 6 e os 24 meses



5. Intenção de coadministração

Não vacinados 68,0%

(IC95%: 66,5%; 69,5%)

n=4082

Informação amostra:


À amostra em causa está associada:

- a. Uma margem de erro de $\pm 1,5\%$ para um IC de 95% no **total da amostra** (n=4082);
- b. Uma margem de erro de $\pm 2,5\%$ para um IC de 95% dentro do Target **65 ou mais anos** (n=1540);
- c. Uma margem de erro de $\pm 3,3\%$ para um IC de 95% dentro do Target **Doentes Crónicos** (n=899);
- d. Uma margem de erro de $\pm 3,8\%$ para um IC de 95% dentro do Target **Profissionais de Saúde em Contacto com Doentes** (n=652);
- e. Uma margem de erro de $\pm 3,6\%$ para um IC de 95% dentro do Target **60-64 anos** (n=731);
- f. Uma margem de erro de $\pm 4,0\%$ para um IC de 95% dentro do Target **Grávidas** (n=601);
- g. Uma margem de erro de $\pm 4,7\%$ para um IC de 95% dentro do Target **Crianças entre os 6 e os 24 meses** (n=435)

SUBAMOSTRA DE INQUIRIDOS QUE TEM INTENÇÃO DE SE VACINAR, COM MAIS DE 60 ANOS DE IDADE

65 OU MAIS ANOS DE IDADE

(valores em %)




n=570

- Tenciona levar a coadministração
- Não tenciona levar a coadministração

60– 64 ANOS DE IDADE

(valores em %)



n=113

- Tenciona levar a coadministração
- Não tenciona levar a coadministração




7. Vacinação contra a gripe no ano passado

Informação amostra:

À amostra em causa está associada:

- a. Uma margem de erro de $\pm 1,5\%$ para um IC de 95% no **total da amostra** (n=4082);
- b. Uma margem de erro de $\pm 2,5\%$ para um IC de 95% dentro do Target **65 ou mais anos** (n=1540);
- c. Uma margem de erro de $\pm 3,3\%$ para um IC de 95% dentro do Target **Doentes Crónicos** (n=899);
- d. Uma margem de erro de $\pm 3,8\%$ para um IC de 95% dentro do Target **Profissionais de Saúde em Contacto com Doentes** (n=652);
- e. Uma margem de erro de $\pm 3,6\%$ para um IC de 95% dentro do Target **60-64 anos** (n=731);
- f. Uma margem de erro de $\pm 4,0\%$ para um IC de 95% dentro do Target **Grávidas** (n=601);
- g. Uma margem de erro de $\pm 4,7\%$ para um IC de 95% dentro do Target **Crianças entre os 6 e os 24 meses** (n=435)



(*) Questão não aplicada ao target Crianças entre os 6 e os 24 meses




6. Vacinação contra a gripe antes da pandemia COVID-19

Informação amostra:

À amostra em causa está associada:

- a. Uma margem de erro de $\pm 1,5\%$ para um IC de 95% no **total da amostra** (n=4082);
- b. Uma margem de erro de $\pm 2,5\%$ para um IC de 95% dentro do Target **65 ou mais anos** (n=1540);
- c. Uma margem de erro de $\pm 3,3\%$ para um IC de 95% dentro do Target **Doentes Crónicos** (n=899);
- d. Uma margem de erro de $\pm 3,8\%$ para um IC de 95% dentro do Target **Profissionais de Saúde em Contacto com Doentes** (n=652);
- e. Uma margem de erro de $\pm 3,6\%$ para um IC de 95% dentro do Target **60-64 anos** (n=731);
- f. Uma margem de erro de $\pm 4,0\%$ para um IC de 95% dentro do Target **Grávidas** (n=601);
- g. Uma margem de erro de $\pm 4,7\%$ para um IC de 95% dentro do Target **Crianças entre os 6 e os 24 meses** (n=435)

(*) Questão não aplicada ao target Crianças entre os 6 e os 24 meses



n=3647 (*)

- Era habitual vacinar-se contra a gripe antes da pandemia COVID-19
- Não era habitual vacinar-se contra a gripe antes da COVID-19



6. Vacinação contra a gripe antes da pandemia COVID-19


Informação amostra:

À amostra em causa está associada:

- a. Uma margem de erro de $\pm 1,5\%$ para um IC de 95% no total da amostra (n=4082);
- b. Uma margem de erro de $\pm 2,5\%$ para um IC de 95% dentro do Target **65 ou mais anos** (n=1540);
- c. Uma margem de erro de $\pm 3,3\%$ para um IC de 95% dentro do Target **Doentes Crónicos** (n=899);
- d. Uma margem de erro de $\pm 3,8\%$ para um IC de 95% dentro do Target **Profissionais de Saúde em Contacto com Doentes** (n=652);
- e. Uma margem de erro de $\pm 3,6\%$ para um IC de 95% dentro do Target **60-64 anos** (n=731);
- f. Uma margem de erro de $\pm 4,0\%$ para um IC de 95% dentro do Target **Grávidas** (n=601);
- g. Uma margem de erro de $\pm 4,7\%$ para um IC de 95% dentro do Target **Crianças entre os 6 e os 24 meses** (n=435)

65 OU MAIS ANOS DE IDADE

(valores em %)




n=1540

- Era habitual vacinar-se contra a gripe antes da pandemia COVID-19
- Não era habitual vacinar-se contra a gripe antes da COVID-19

60– 64 ANOS DE IDADE

(valores em %)



n=731

- Era habitual vacinar-se contra a gripe antes da pandemia COVID-19
- Não era habitual vacinar-se contra a gripe antes da COVID-19




11. Informação sobre dose elevada

Informação amostra:

À amostra em causa está associada:

- a. Uma margem de erro de $\pm 1,5\%$ para um IC de 95% no **total da amostra** (n=4082);
- b. Uma margem de erro de $\pm 2,5\%$ para um IC de 95% dentro do Target **65 ou mais anos** (n=1540);
- c. Uma margem de erro de $\pm 3,3\%$ para um IC de 95% dentro do Target **Doentes Crónicos** (n=899);
- d. Uma margem de erro de $\pm 3,8\%$ para um IC de 95% dentro do Target **Profissionais de Saúde em Contacto com Doentes** (n=652);
- e. Uma margem de erro de $\pm 3,6\%$ para um IC de 95% dentro do Target **60-64 anos** (n=731);
- f. Uma margem de erro de $\pm 4,0\%$ para um IC de 95% dentro do Target **Grávidas** (n=601);
- g. Uma margem de erro de $\pm 4,7\%$ para um IC de 95% dentro do Target **Crianças entre os 6 e os 24 meses** (n=435)

(*) Questão não aplicada ao target Crianças entre os 6 e os 24 meses



- Sabe que está disponível uma vacina de dose elevada para população >85 anos
- Não sabe que está disponível uma vacina de dose elevada para população >85 anos




9. Vacinação contra a COVID-19 no ano passado

Informação amostra:

À amostra em causa está associada:

- a. Uma margem de erro de $\pm 1,5\%$ para um IC de 95% no total da amostra (n=4082);
- b. Uma margem de erro de $\pm 2,5\%$ para um IC de 95% dentro do Target *65 ou mais anos* (n=1540);
- c. Uma margem de erro de $\pm 3,3\%$ para um IC de 95% dentro do Target *Doentes Crónicos* (n=899);
- d. Uma margem de erro de $\pm 3,8\%$ para um IC de 95% dentro do Target *Profissionais de Saúde em Contacto com Doentes* (n=652);
- e. Uma margem de erro de $\pm 3,6\%$ para um IC de 95% dentro do Target *60-64 anos* (n=731);
- f. Uma margem de erro de $\pm 4,0\%$ para um IC de 95% dentro do Target *Grávidas* (n=601);
- g. Uma margem de erro de $\pm 4,7\%$ para um IC de 95% dentro do Target *Crianças entre os 6 e os 24 meses* (n=435)



(*) Questão não aplicada ao target Crianças entre os 6 e os 24 meses




Informação amostra:

À amostra em causa está associada:


- a. Uma margem de erro de $\pm 1,5\%$ para um IC de 95% no **total da amostra** (n=4082);
- b. Uma margem de erro de $\pm 2,5\%$ para um IC de 95% dentro do Target **65 ou mais anos** (n=1540);
- c. Uma margem de erro de $\pm 3,3\%$ para um IC de 95% dentro do Target **Doentes Crónicos** (n=899);
- d. Uma margem de erro de $\pm 3,8\%$ para um IC de 95% dentro do Target **Profissionais de Saúde em Contacto com Doentes** (n=652);
- e. Uma margem de erro de $\pm 3,6\%$ para um IC de 95% dentro do Target **60-64 anos** (n=731);
- f. Uma margem de erro de $\pm 4,0\%$ para um IC de 95% dentro do Target **Grávidas** (n=601);
- g. Uma margem de erro de $\pm 4,7\%$ para um IC de 95% dentro do Target **Crianças entre os 6 e os 24 meses** (n=435)

DA INFORMAÇÃO QUE TEM, A GRIPE PODE PROVOCAR ALGUMA DAS SEGUINTES COMPLICAÇÕES?


ENFARTE AGUDO DO MIOCÁRDIO OU ATAQUE CARDÍACO




AVC



PNEUMONIA



DESCOMPENSAÇÃO DE DOENÇAS COMO A DIABETES, ASMA OU DPOC



(*) Questão não aplicada ao target Crianças entre os 6 e os 24 meses





Informação amostra:

À amostra em causa está associada:

- a. Uma margem de erro de $\pm 1,5\%$ para um IC de 95% no **total da amostra** (n=4082);
- b. Uma margem de erro de $\pm 2,5\%$ para um IC de 95% dentro do Target **65 ou mais anos** (n=1540);
- c. Uma margem de erro de $\pm 3,3\%$ para um IC de 95% dentro do Target **Doentes Crónicos** (n=899);
- d. Uma margem de erro de $\pm 3,8\%$ para um IC de 95% dentro do Target **Profissionais de Saúde em Contacto com Doentes** (n=652);
- e. Uma margem de erro de $\pm 3,6\%$ para um IC de 95% dentro do Target **60-64 anos** (n=731);
- f. Uma margem de erro de $\pm 4,0\%$ para um IC de 95% dentro do Target **Grávidas** (n=601);
- g. Uma margem de erro de $\pm 4,7\%$ para um IC de 95% dentro do Target **Crianças entre os 6 e os 24 meses** (n=435)


DA INFORMAÇÃO QUE TEM, A GRIPE PODE PROVOCAR ALGUMA DAS SEGUINTES COMPLICAÇÕES?

						
	Total	65 ou mais anos de idade	Doentes crónicos	Prof. de Saúde (*)	60– 64 anos	Grávidas
	n=3647	n=1471	n=888	n=652	n=731	n=601
ENFARTE AGUDO DO MIOCÁRDIO OU ATAQUE CARDÍACO	30,4%	28,9%	28,9%	48,5%	20,0%	29,3%
AVC	20,1%	15,6%	20,8%	31,7%	8,2%	33,8%
PNEUMONIA	67,2%	69,5%	59,0%	81,1%	60,6%	59,1%
DESCOMPENSAÇÃO DE DOENÇAS COMO A DIABETES, ASMA OU DPOC	40,4%	34,6%	41,9%	75,2%	23,8%	38,1%

Nota: Os valores apresentados dizem respeito à percentagem de “Sim” em cada uma das complicações apresentadas.

VACINOMETRO

Sub-análise População Grávidas



1. Percentagem de indivíduos vacinados


VACINOMETRO



Informação amostra:

À amostra em causa está associada:

Uma margem de erro de $\pm 4,0\%$ para um IC de 95% dentro do Target *Grávidas* (n=601);




2. Motivos que levaram à Vacinação

Vacinadas 38,6%
(IC95%: 34,6%; 40,6%)

n=601

Informação amostra:

À amostra em causa está associada:

Uma margem de erro de $\pm 4,0\%$ para um IC de 95% dentro do Target *Grávidas* (n=601);


3. Histórico de vacinação

Vacinadas 38,6%
(IC95%: 34,6%; 40,6%)

n=601

Informação amostra:

À amostra em causa está associada:

Uma margem de erro de $\pm 4,0\%$ para um IC de 95% dentro do Target *Grávidas* (n=601);

4. Aquisição da Vacina

Vacinadas 38,6%
(IC95%: 34,6%; 40,6%)


n=601

Informação amostra:

À amostra em causa está associada:

Uma margem de erro de $\pm 4,0\%$ para um IC de 95% dentro do Target *Grávidas* (n=601);

(valores em %)





Informação amostra:
À amostra em causa está associada:
Uma margem de erro de $\pm 4,0\%$ para um IC de 95% dentro do Target *Grávidas* (n=601);

5. Razões para não ter sido vacinada

Não vacinadas 61,4%
(IC95%: 57,4%; 65,4%)

n=601



6. Intenção de Vacinação


Não vacinadas 61,4%

(IC95%: 57,4%; 65,4%)

n=601

Informação amostra:

À amostra em causa está associada:

Uma margem de erro de $\pm 4,0\%$ para um IC de 95% dentro do Target *Grávidas* (n=601);


VACINOMETRO

Sub-análise Crianças entre 6 e 24 meses



Informação amostra:
À amostra em causa está associada:
Uma margem de erro de $\pm 4,7\%$ para um IC de 95% dentro do Target *Crianças entre 6 e 24 meses* (n=435)

1. Percentagem de indivíduos vacinados






Informação amostra:
À amostra em causa está associada:
Uma margem de erro de $\pm 4,7\%$ para um IC de 95% dentro do Target *Crianças entre 6 e 24 meses* (n=435)

2. Motivos que levaram à Vacinação

Vacinadas 26,2%
(IC95%: 21,5%; 30,9%)

n=435






5. Razões para não ter sido vacinada

Não vacinadas 73,8%
(IC95%: 69,1%; 78,5%)

n=435

Informação amostra:
À amostra em causa está associada:
Uma margem de erro de $\pm 4,7\%$ para um IC de 95% dentro do Target *Crianças entre 6 e 24 meses* (n=435)






Informação amostra:
À amostra em causa está associada:
Uma margem de erro de $\pm 4,7\%$ para um IC de 95% dentro do Target *Crianças entre 6 e 24 meses* (n=435)

6. Intenção de Vacinação

Não vacinadas 73,8%
(IC95%: 69,1%; 78,5%)

n=435






6. Razões para não ter intenção de vacinar o filho

Não vacinadas 73,8%
(IC95%: 69,1%; 78,5%)

n=435

Informação amostra:
À amostra em causa está associada:
Uma margem de erro de $\pm 4,7\%$ para um IC de 95% dentro do Target *Crianças entre 6 e 24 meses* (n=435)






Informação amostra:
À amostra em causa está associada:
Uma margem de erro de $\pm 4,7\%$ para um IC de 95% dentro do Target *Crianças entre 6 e 24 meses* (n=435)

n=435

AS CRIANÇAS SÃO MAIS VULNERÁVEIS À GRIPE DO QUE OS ADULTOS




Média	6,49
Mediana	7,00
Moda	7,00



8. Pessoa em que mais confia para recomendação de vacinas para o filho

Informação amostra:
À amostra em causa está associada:
Uma margem de erro de $\pm 4,7\%$ para um IC de 95% dentro do Target *Crianças entre 6 e 24 meses* (n=435)

n=435



VACINOMETRO

Sub-análise População com Diabetes




1. Percentagem de indivíduos vacinados



Informação amostra:

À amostra em causa está associada:

Uma margem de erro de $\pm 6,4\%$ para um IC de 95% dentro do Target *População com Diabetes* (n=234)


2. Motivos que levaram à Vacinação

Vacinados 43,5%
(IC95%: 37,1%; 49,9%)

n=234

Informação amostra:

À amostra em causa está associada:

Uma margem de erro de $\pm 6,4\%$ para um IC de 95% dentro do Target *População com Diabetes* (n=234)


3. Histórico de Vacinação

Vacinados 43,5%
(IC95%: 37,1%; 49,9%)

n=234

Informação amostra:

À amostra em causa está associada:

Uma margem de erro de $\pm 6,4\%$ para um IC de 95% dentro do Target *População com Diabetes* (n=234)

4. Aquisição da Vacina

Vacinados 43,5%
(IC95%: 37,1%; 49,9%)


n=234

Informação amostra:

À amostra em causa está associada:

Uma margem de erro de $\pm 6,4\%$ para um IC de 95% dentro do Target *População com Diabetes* (n=234)

(valores em %)



■ Recebida gratuitamente no Centro de Saúde ■ Recebida gratuitamente na farmácia

■ Outro local




Informação amostra:
À amostra em causa está associada:
Uma margem de erro de $\pm 6,4\%$ para um IC de 95% dentro do Target *População com Diabetes* (n=234)

5. Motivo de não vacinação

Não vacinados 56,5%
(IC95%: 50,1%; 62,9%)

n=234



6. Intenção de Vacinação


Não vacinados 56,5%

(IC95%: 50,1%; 62,9%)

n=234


Informação amostra:

À amostra em causa está associada:

Uma margem de erro de $\pm 6,4\%$ para um IC de 95% dentro do Target *População com Diabetes* (n=234)

VACINOMETRO


Sub-análise População com Doença Cardiovascular





1. Percentagem de indivíduos vacinados

Informação amostra:
À amostra em causa está associada:
Uma margem de erro de $\pm 5,4\%$ para um IC de 95% dentro do Target *População com Doença Cardiovascular* (n=327)






2. Motivos que levaram à Vacinação

Vacinados 43,7%
(IC95%: 38,3%; 49,1%)

n=327

Informação amostra:
À amostra em causa está associada:
Uma margem de erro de $\pm 5,4\%$ para um IC de 95% dentro do Target *População com Doença Cardiovascular* (n=327)






3. Histórico de Vacinação

Vacinados 43,7%
(IC95%: 38,3%; 49,1%)

n=327

Informação amostra:
À amostra em causa está associada:
Uma margem de erro de $\pm 5,4\%$ para um IC de 95% dentro do Target *População com Doença Cardiovascular* (n=327)






4. Aquisição da Vacina

Vacinados 43,7%
(IC95%: 38,3%; 49,1%)

n=327

Informação amostra:
À amostra em causa está associada:
Uma margem de erro de $\pm 5,4\%$ para um IC de 95% dentro do Target *População com Doença Cardiovascular* (n=327)






5. Motivo de não vacinação

Não vacinados 56,3%
(IC95%: 50,9%; 61,7%)

n=327

Informação amostra:
À amostra em causa está associada:
Uma margem de erro de $\pm 5,4\%$ para um IC de 95% dentro do Target *População com Doença Cardiovascular* (n=327)






6. Intenção de Vacinação

Não vacinados 56,3%
(IC95%: 50,9%; 61,7%)


n=327

Informação amostra:
À amostra em causa está associada:
Uma margem de erro de $\pm 5,4\%$ para um IC de 95% dentro do Target *População com Doença Cardiovascular* (n=327)



VACINOMETRO


Sub-análise População com Doenças Respiratórias





1. Percentagem de indivíduos vacinados

Informação amostra:
À amostra em causa está associada:
Uma margem de erro de $\pm 5,8\%$ para um IC de 95% dentro do Target *População com Doenças Respiratórias* (n=287)






2. Motivos que levaram à Vacinação

Vacinados 42,5%
(IC95%: 36,7%; 48,3%)

n=287

Informação amostra:
À amostra em causa está associada:
Uma margem de erro de $\pm 5,8\%$ para um IC de 95% dentro do Target *População com Doenças Respiratórias* (n=287)






Informação amostra:
À amostra em causa está associada:
Uma margem de erro de $\pm 5,8\%$ para um IC de 95% dentro do Target *População com Doenças Respiratórias* (n=287)

3. Histórico de Vacinação

Vacinados 42,5%
(IC95%: 36,7%; 48,3%)

n=287






4. Aquisição da Vacina

Vacinados 42,5%

(IC95%: 36,7%; 48,3%)

n=287

Informação amostra:
À amostra em causa está associada:
Uma margem de erro de ± 5,8% para um IC de 95% dentro do Target *População com Doenças Respiratórias* (n=287)



- Comprada na Farmácia
- Recebida gratuitamente no Centro de Saúde
- Recebida gratuitamente no local de trabalho
- Recebida gratuitamente na Farmácia
- Outro local




Informação amostra:
À amostra em causa está associada:
Uma margem de erro de $\pm 5,8\%$ para um IC de 95% dentro do Target *População com Doenças Respiratórias* (n=287)

5. Motivo de não vacinação

Não vacinados 57,5%
(IC95%: 51,7%; 63,3%)

n287






6. Intenção de Vacinação

Não vacinados 57,5%
(IC95%: 51,7%; 63,3%)

n287

Informação amostra:
À amostra em causa está associada:
Uma margem de erro de $\pm 5,8\%$ para um IC de 95% dentro do Target *População com Doenças Respiratórias* (n=287)



VACINOMETRO


Sub-análise População ≥ 60 anos





Informação amostra:
À amostra em causa está associada:
Uma margem de erro de $\pm 2,1\%$ para um IC de 95% dentro do Target *População ≥ 60 anos* n=2271)

1. Percentagem de indivíduos vacinados




2. Motivos que levaram à Vacinação

Vacinados 31,7%
(IC95%: 29,6%; 33,8%)

n=2271

Informação amostra:

À amostra em causa está associada:

Uma margem de erro de $\pm 2,1\%$ para um IC de 95% dentro do Target **População ≥ 60 anos n=2271**)


4. Histórico de Vacinação

Vacinados 31,7%
(IC95%: 29,6%; 33,8%)

n=2271

Informação amostra:

À amostra em causa está associada:

Uma margem de erro de $\pm 2,1\%$ para um IC de 95% dentro do Target **População ≥ 60 anos n=2271**)




5. Aquisição da Vacina

Vacinados 31,7%

(IC95%: 29,6%; 33,8%)

n=2271

Informação amostra:
À amostra em causa está associada:
Uma margem de erro de ± 2,1% para um IC de 95% dentro do Target *População ≥ 60 anos* n=2271)





Informação amostra:
À amostra em causa está associada:
Uma margem de erro de $\pm 2,1\%$ para um IC de 95% dentro do Target *População ≥ 60 anos* n=2271)

7. Motivo de não vacinação

Não vacinados 68,3%
(IC95%: 66,2%; 70,4%)

n=2271



8. Intenção de Vacinação


Não vacinados 68,3%

(IC95%: 66,2%; 70,4%)

n=2271

Informação amostra:

À amostra em causa está associada:

Uma margem de erro de $\pm 2,1\%$ para um IC de 95% dentro do Target *População ≥ 60 anos* n=2271)

VACINOMETRO


Sub-análise População dos 70 aos 79 anos





Informação amostra:
À amostra em causa está associada:
Uma margem de erro de $\pm 4,2\%$ para um IC de 95% dentro do Target *População dos 70 aos 79 anos* (n=544)

1. Percentagem de indivíduos vacinados






Informação amostra:
À amostra em causa está associada:
Uma margem de erro de $\pm 4,2\%$ para um IC de 95% dentro do Target *População dos 70 aos 79 anos* (n=544)

2. Motivos que levaram à Vacinação

Vacinados 40,4%
(IC95%: 36,2%; 44,6%)
n=544



4. Histórico de Vacinação


Vacinados 40,4%
(IC95%: 36,2%; 44,6%)

n=544

Informação amostra:

À amostra em causa está associada:

Uma margem de erro de $\pm 4,2\%$ para um IC de 95% dentro do Target *População dos 70 aos 79 anos (n=544)*



5. Aquisição da Vacina

Vacinados 40,4%


(IC95%: 36,2%; 44,6%)

n=544

Informação amostra:

À amostra em causa está associada:

Uma margem de erro de $\pm 4,2\%$ para um IC de 95% dentro do Target *População dos 70 aos 79 anos* (n=544)





Informação amostra:
À amostra em causa está associada:
Uma margem de erro de $\pm 4,2\%$ para um IC de 95% dentro do Target *População dos 70 aos 79 anos* (n=544)

7. Motivo de não vacinação

Não vacinados 59,6%
(IC95%: 55,4%; 63,8%)

n=544



8. Intenção de Vacinação


Não vacinados 59,6%
(IC95%: 55,4%; 63,8%)

n=544

Informação amostra:

À amostra em causa está associada:

Uma margem de erro de $\pm 4,2\%$ para um IC de 95% dentro do Target *População dos 70 aos 79 anos* (n=544)



VACINOMETRO


Sub-análise População ≥ 80 anos





Informação amostra:
À amostra em causa está associada:
Uma margem de erro de $\pm 5,0\%$ para um IC de 95% dentro do Target **População ≥ 80 anos** (n=385)

1. Percentagem de indivíduos vacinados






Informação amostra:
À amostra em causa está associada:
Uma margem de erro de $\pm 5,0\%$ para um IC de 95% dentro do Target **População ≥ 80 anos** (n=385)

2. Motivos que levaram à Vacinação

Vacinados 48,8%
(IC95%: 43,8%; 53,8%)
n=385



3. Histórico de Vacinação

Vacinados 48,8%

(IC95%: 43,8%; 53,8%)


n=385

Informação amostra:

À amostra em causa está associada:

Uma margem de erro de $\pm 5,0\%$ para um IC de 95% dentro do Target *População ≥ 80 anos* (n=385)

(valores em %)



n=385

- Já se vacinou contra a gripe em anos anteriores
- Não se vacinou contra a gripe em anos anteriores

4. Aquisição da Vacina


Vacinados 48,8%

(IC95%: 43,8%; 53,8%)

n=385

Informação amostra:

À amostra em causa está associada:

Uma margem de erro de $\pm 5,0\%$ para um IC de 95% dentro do Target *População ≥ 80 anos* (n=385)




Informação amostra:
À amostra em causa está associada:
Uma margem de erro de $\pm 5,0\%$ para um IC de 95% dentro do Target *População ≥ 80 anos* (n=385)

5. Motivo de não vacinação

Não vacinados 51,2%

(IC95%: 46,2%; 56,2%)

n=385



6. Intenção de Vacinação


Não vacinados 51,2%

(IC95%: 46,2%; 56,2%)

n=385

Informação amostra:

À amostra em causa está associada:

Uma margem de erro de $\pm 5,0\%$ para um IC de 95% dentro do Target **População ≥ 80 anos** (n=385)

VACINOMETRO

Sub-análise População ≥ 85 anos




1. Percentagem de indivíduos vacinados



Informação amostra:

À amostra em causa está associada:


Uma margem de erro de $\pm 7,4\%$ para um IC de 95% dentro do Target *População ≥ 85 anos* (n=175)



Informação amostra:
À amostra em causa está associada:
Uma margem de erro de $\pm 7,4\%$ para um IC de 95% dentro do Target **População ≥ 85 anos** (n=175)

2. Motivos que levaram à Vacinação

Vacinados 49,7%
(IC95%: 42,3%; 57,1%)
n=175




3. Informação sobre dose elevada

Vacinados 49,7%
(IC95%: 42,3%; 57,1%)

n=175

Informação amostra:

À amostra em causa está associada:

Uma margem de erro de $\pm 7,4\%$ para um IC de 95% dentro do Target *População ≥ 85 anos* (n=175)

- O profissional informou que estava a administrar vacina de dose elevada
- O profissional não informou que estava a administrar vacina de dose elevada

4. Histórico de Vacinação

Vacinados 49,7%

(IC95%: 42,3%; 57,1%)


n=175

Informação amostra:

À amostra em causa está associada:

Uma margem de erro de $\pm 7,4\%$ para um IC de 95% dentro do Target *População ≥ 85 anos* (n=175)

(valores em %)



n=88

- Já se vacinou contra a gripe em anos anteriores
- Não se vacinou contra a gripe em anos anteriores




5. Aquisição da Vacina

Vacinados 49,7%

(IC95%: 42,3%; 57,1%)

n=175

Informação amostra:
À amostra em causa está associada:
Uma margem de erro de ± 7,4% para um IC de 95% dentro do Target *População ≥ 85 anos* (n=175)



- Comprada na Farmácia
- Recebida gratuitamente no Centro de Saúde
- Recebida gratuitamente no local de trabalho
- Recebida gratuitamente na Farmácia
- Outro local


6. Escolha do local de vacinação

Vacinados 85,1%
(IC95%: 76,6%; 93,6%)

n=175

SE PUDESSE ESCOLHER O LOCAL ONDE
RECEBER A VACINA, QUE LOCAL ESCOLHIA?

(valores em %)



Informação amostra:

À amostra em causa está associada:

Uma margem de erro de $\pm 7,4\%$ para um IC de 95% dentro do Target *População ≥ 85 anos* (n=175)




Informação amostra:
À amostra em causa está associada:
Uma margem de erro de $\pm 7,4\%$ para um IC de 95% dentro do Target **População ≥ 85 anos** (n=175)

7. Motivo de não vacinação

Não vacinados 50,3%
(IC95%: 42,9%; 57,7%)

n=175





8. Intenção de Vacinação

Não vacinados 50,3%


(IC95%: 42,9%; 57,7%)

n=175

Informação amostra:

À amostra em causa está associada:

Uma margem de erro de ± 7,4% para um IC de 95% dentro do Target *População ≥ 85 anos* (n=175)



VACINOMETRO

Principais Insights



PRINCIPAIS *INSIGHTS*

- Com diferenças em termos da constituição da amostra e da calendarização da realização do Vacinómetro face à época anterior, os dados globais não são totalmente comparáveis com a época 2024/25, embora se note uma tendência na semelhança das taxas de vacinação dos vários grupos
- Na época atual foi reforçada a amostra do grupo 65+, foi eliminada da amostra a sub-amostra de inquiridos com idade entre os 18 e os 59 pela consistência nas baixas taxas de vacinação ao longo de todas as vagas realizadas nos últimos anos e por ser um grupo que não faz parte da norma de vacinação e foi incluída uma sub-amostra de pais de crianças com idades entre os 6 e os 24 meses por ter sido um grupo incluído nos grupos com recomendação para vacinação gratuita contra a gripe
- **32% da amostra total inquirida foi vacinada contra a gripe nesta época vacinal**
- Olhando especificamente para cada um dos subgrupos, destaca-se que são os doentes crónicos (44,6%), os 65+ (39,0%) e as grávidas (38,6%) os grupos com mais elevada taxa de vacinação, e o grupo com idade entre os 60 e os 64 anos de idade aquele que até ao momento menos se vacinou (16,1%)
- Na comparação direta com os dados disponibilizados pela DGS através do seu boletim semanal é de salientar que os resultados de ambas as fontes se encontram bastante alinhados, com pequenas diferenças abrangidas pelos intervalos de confiança considerados em cada sub-amostra do Vacinómetro
- Os principais motivos que levaram à vacinação foram a recomendação do médico (49,3%), que é um resultado transversal a todos os grupos em análise, à exceção dos profissionais de saúde que naturalmente se vacinam, essencialmente, no contexto de iniciativas laborais.
- Também de forma transversal, nota-se a existência de um histórico de vacinação em todos os grupos, à exceção das grávidas e das crianças entre os 6 e os 24 meses
- No que se refere à administração da vacina, a amostra distribui-se maioritariamente entre quem a recebeu gratuitamente no Centro de Saúde (maioritariamente 65+) e quem a recebeu gratuitamente na farmácia (maioritariamente 60-64)
- Em 62% dos inquiridos vacinados a vacina da gripe foi feita em coadministração com a vacina da COVID por considerarem que ambas as vacinas são importantes para a proteção da saúde. Nos casos em que não optaram pela coadministração, o principal motivo foi a não recomendação da mesma pelo médico
- Olhando para os inquiridos não vacinados, os principais motivos que justificam esta decisão passam pela falta de hábito e pela falta de oportunidade. Cerca de 1/3 dos não vacinados pretende ainda fazê-lo durante esta época vacinal, sendo os que mais demonstram essa vontade, os grupos mais frágeis, quer pela sua idade (65+) quer pela existência de patologias crónicas (60,7% e 61,8%, respetivamente)
- Pouco mais de metade dos inquiridos refere ter conhecimento sobre a existência de uma vacina de dose elevada a ser administrada à população acima dos 85 anos

VACINOMETRO

Resultados dia 21 de Outubro

1.ª Vaga

Trabalho de campo de 15 de Outubro a 20 de Outubro de 2025

Época 2025-2026